


Atenție la căpușe!



- Sezonul cald și ieșirile în aer liber sunt însoțite de apariția înțepăturilor de căpușe
- Dacă ați descoperit căpușa atașată pe piele, trebuie să vă prezentați la o unitate medicală (medic de familie, centru de permanență, cabinet boli infecțioase, ambulatoriu de specialitate)

- Căpușa se îndepărtează cu o pensă specială. 
- Se va supraveghea zona înțepată timp de 1 lună
- Dacă apare reacție locală (roșeață, eritem) se va prezenta la medicul de familie, care va stabili necesitatea trimerii pentru consult boli infecțioase
- În funcție de aspectul erupției se vor lua măsuri de tratament cu antibiotic și investigații specifice
- Subliniem că nu toate căpușele, ci doar un procent de 10-20% pot fi purtătoare de bacteria *Borrelia Burdorferi*, cea care provoacă Boala Lyme

Cum se previne înțepătura de căpușă



- Se evită zonele cu iarbă și arbori
- Se poartă haine deschise la culoare, care să acopere zonele expuse atunci când se fac plimbări în natură
- Se aplică spray cu efect repelent
- Verificare atentă la întoarcerea acasă (valabil și pentru animalele de companie)
- Protejarea animalelor de companie împotriva puricilor și a căpușelor